

OREILLONS - item 161

Virus orelien (ARN) à tropisme glandulaire et neuro
Contagion air gouttelettes \ominus 2J \rightarrow \oplus 4J interhumaine

Clinique

incubation 15-21J

- * ① invasion fièvre, otalgie et gêne mastication uni puis bilatérale
- * ② phase d'état
 - $\frac{1}{3}$ \emptyset
 - $\frac{70\%}{\text{+/-} \rightarrow \text{+/+ asy}}$ parotidite $\frac{1}{2}$ \rightarrow orchite $\frac{25\%}{\text{at SPGenese}}$ atrophie testiculaire \rightarrow TC chez adulte
 - $\frac{4\%}{\text{oedemateuse}}$ pancréatite \rightarrow TC chez adulte
 - meningite \neq (50% isolée) lymphocytaire
 - $\frac{1\%}{\text{av ou ap la parotidite}}$ encephalite avec att. VIII Δ surdité, 1-5% décès

Diagnostic

- ①/- si doute prélevement sg / urine / LCR **RT PCR** ds les \ll 4J
- ① **serologie** si \emptyset vaccin
- \rightarrow leuco \downarrow et amylase \uparrow

PEC

guérison spont en 8-10J

* **vaccin** obligatoire 1 rappel / **maladie** immunité à vie

M12
 \downarrow
1inj

\oplus M16-18
 \downarrow
2 inject
à \geq 1M

\rightarrow vaccin tétravalent